

Histoséminaire

Renseignements cliniques

Cas n° 1 :

Femme de 56 ans. Tumeur de la parotide droite connue depuis plusieurs mois, indolore. Pas de paralysie faciale ni d'adénopathie cervicale.

Taille = 3,5 x 2,5x 2cm ; bonne limitation, coloration jaune ou plus blanche. Photo.

Cas n° 2 :

Homme de 74 ans. Tumeur du pôle inférieur de la parotide gauche, connue depuis environ 20 ans ; augmentation récente de volume. Cytoponction suspecte. Tumeur de 5x 3,5 cm, remaniée, brunâtre. Photo.

Cas n° 3 :

Femme de 61 ans. Exérèse d'une petite tuméfaction de la lèvre supérieure.

Cas n° 4 :

Homme de 64 ans. Tumeur de la glande sub mandibulaire gauche connue depuis quelques mois, asymptomatique. Tumeur de 3 x 2,5cm, de coloration hétérogène, blanchâtre avec remaniements hémorragiques et nécrotiques. Photo.

Cas n° 5 :

Femme de 35 ans. Découverte d'une lésion nodulaire de 0,6cm de la muqueuse du palais buccal.

Cas n° 6 :

Homme de 38 ans. Tumeur parotidienne gauche évoluant depuis 3 ans, ferme, indolore, sans paralysie faciale. Pas d'adénopathie satellite. Aspect hétérogène superficiel sur 2cm au scanner. Aspect de tumeur salivaire remaniée en cytoponction. Photo.

Cas n° 7 :

Femme de 64 ans. Découverte fortuite d'une tumeur parotidienne.

Cas n° 8 :

Homme de 32 ans. Tuméfaction parotidienne droite connue depuis plusieurs années avec augmentation de volume récente et douloureuse depuis un mois. Cytoponction suspecte. Photo.

Cas n° 9 :

Femme de 70 ans. Tuméfaction sous parotidienne gauche ; pas d'antécédent particulier.

Cas n° 10 :

Homme de 72 ans. Tumeur parotidienne gauche apparue brutalement en août 2009. Antécédent d'adénocarcinome pulmonaire lobaire supérieur droit traité en 2001. Photo.